



A TERMÉSZETES FELLÁCIÓRA VONATKOZÓ TANÁCSUNK



A TERMÉSZETES FELLATIO NEM KOCKÁZATMENTES

Ha óvszer nélkül végzi az orális szexet, fennáll a veszélye annak, **hogy számos szexuális úton terjedő fertőzéssel** (klamídia, gonorrhoea, hepatitis B, HPV, herpesz) fertőződik meg.

1# Kerülje a fogmosást és a szájöblítést.



A fogmosás vagy a szájöblítés közvetlenül a felláció előtt vagy után azzal a kockázattal jár, hogy mikrosebek keletkeznek, amelyek a fertőzések könnyebb átjutását teszik lehetővé

Ha szükséges, öblítse ki a száját vízzel, és várjon körülbelül 3 órát a fogmosás előtt.

2# Kerülje, hogy sperma kerüljön a szájába.



A szexuális úton terjedő fertőzésekkel való megfertőződés kockázata megnő, ha ondó kerül a szádba, különösen, ha lenyeled

3# Kerülje a mélytorkos szexet óvszer nélkül.



A torok egy törékeny nyálkahártya, amely érzékeny a fertőzésekre

A védekezés nélküli mélytorokozás visszautasítása egyben emlékeztető is a kliensed számára, hogy az orális szex védekezéssel még jobb lehet...

4# Menjen el 6 havonta egyszer szűrővizsgálatra



Ha természetes módon végzi az orális szexet, ne felejtse **el 6 havonta elvégeztetni a vizsgálatot**. Ha a torka irritált, fájdalmas, vörös vagy duzzadt... **Menjen orvoshoz!**



A kondilómák (a HPV által okozott csomók) a torokban is kialakulhatnak!